NATPEARL®

Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC

Systemic Fungicide

Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC is a broad-spectrum fungicide having systemic activity against major pathogens. It is recommended for the control of Anthracnose and Powdery mildew of Chilli, Early blight and Late blight of Tomato, Blast & Sheath blight of Paddy, Blight & Downy mildew of Maize, Rust & Powdery mildew of Wheat, Leaf spot & Grey mildew of Cotton, Red rot, Smut & Rust of Sugarcane, Purple blotch, Stemphylium blight & Downy mildew of Onion, Leaf blotch, Leaf spot & Rhizome rot of Turmeric.

Recommendation:

Crops	Common Name of Diseases	Dosage / Ha		Dilution in water (Lt / Ha)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-Entry after each application (Hours)
		A.I. (% Conc. or ml/L)	Formulation (ml / L)			
Cotton	Leaf spot & Grey mildew	0.03% or 0.3 ml/L)	0.1% or 1 ml / liter of water	500	12	24
Sugarcane	Red rot, Smut & Rust			400	265	
Wheat	Rust & Powdery mildew			500	35	
Tomato	Early blight and Late blight			500	5	
Paddy	Blast & Sheath blight			500	31	
Onion	Purple blotch, Stemphylium blight & Downy mildew			500	7	
Maize	Blight & Downy mildew			500	26	
Chilli	Anthracnose & Powdery mildew			500	5	
Turmeric	Leaf blotch, Leaf spot & Rhizome rot			500	60	

Direction of use:

Weather condition: Don't spray during windy and rainy weather.

Soil: Spray when there is sufficient moisture in soil.

Crops stage, application technique & timing, equipment, nozzle type, instruction for mixing & frequency including number of sprays: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop. Give 1-2 sprays (depending on disease pressure, repeat the spray) with knapsack or any other suitable sprayer having hollow cone or any other suitable nozzle at the time when crops are infested with above mentioned diseases.

Precaution: Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing (hand gloves mask, goggles, boots etc.) during application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application. Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use sticks for stirring the spray solution. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. If contamination occurs with concentration or spray mixture, immediately wash skin thoroughly, flush eyes for at least 15 minutes with abundant fresh water, and remove contaminated clothing. After use, thoroughly clean protective equipment and wash entire body and change clothing.

Warning: 1 Not to be used for post-Harvest application. 2. Destroy the container after use as directed on Leaflet. 3. Directions/dosage not relevant for poly houses /confined area as product is meant for use in open field

Symptoms of poisoning: Poisoning may cause symptoms of activity decrease, pupil dilation, moderate foot withdrawal,reduce spiray reflex, increased breathing depth and reduced breath rate etc.

First Aid: Skin contact: Remove clothing and thoroughly wash the affected parts of body with water by soap and water. Inhalation: Remove the affected person from the danger zone to well-ventilated room or to fresh air and protect from undercooling.

In case of suspected poisoning: Seek medical advice immediately.

Eye contact: Immediately irrigate with eye wash solution or clean water, holding the eyelids apart, for at least 15 minutes. Obtain immediate medical attention.

If swallowed: Repeatedly administer medical charcoal in plenty of water. Seek medical advice if a large volume of concentrate was ingested. **Note:** Never give anything by mouth to an unconscious patient and do not induce vomiting.

Phytotoxicity: No Phytotoxicity is observed when used as recommended.

Antidote: No specific antidote is known, apply symptomatic therapy.

Disposal of used container: 1. Dangerous to re-use empty containers hence, packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions: 1. The packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Chemical composition:	% w/w
Azoxystrobin a.i.	18.20
Difenoconazole a.i.	11.40
Napthalenesulfonic acid, sodium salt condensated with formaldehyde	1.22
Block copolymer PO/EO	1.13
Polydimethyl siloxane	0.79
Linear polysaccharide	0.25
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	0.03
Cetyl /stearyl alcohol ethoxylated	20.70
Water	Q.S.
Total	100.00

Caution: 1. The product shall not be used in area where pisciculture / intercropping pisciculture is practiced along with Rice cultivation. 2. The combination product is toxic to fish and aquatic organism therefore not to be used near aquaculture. 3. The combination product not to be used repeatedly on the approved crops to avoid development of resistance 4. Not to be used on crops and diseases other than those mentioned on label / leaflet.

नेटपर्ल

एजोक्सिस्ट्रोबिन १८.२% भा/भा + डाइफेनोकोनाझोल ११.४% भा/भा एस सी

अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक

एजोक्सिस्ट्रोबिन १८.२% भा/भा + डाइफेनोकोनाझोल ११.४% भा/भा हा व्यापक स्पेक्ट्रम फफूंदीनाशक है जिसमें प्रमुख रोगजनकों के खिलाफ प्रणालीगत गतिविधि होती है। इसे मिर्च के एन्थ्रेक्नोज और पाउडरी फफूंदी, टमाटर के अगेती झुलसा और देर से झुलसा रोग, धान का ब्लास्ट और शीथ ब्लाइट, मक्का का ब्लाइट और डाउनी फफूंदी, गेहूं का जंग और पाउडर फफूंदी, कपास का पत्ती धब्बा और ग्रे फफूंदी, गन्ना का लाल सड़न, स्मट और जंग, बैंगनी धब्बा, स्टेमफिलियम ब्लाइट और प्याज, पत्ती का दाग़ताली फफूंदी हल्दी का धब्बा, पत्ती का धब्बा और प्रकंद सड़न के नियंत्रण के लिए अनुशंसित किया जाता है।

अनुशंसा:

फसल	रोग के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर/हेक्टेयर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनःप्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		सा.तत्व (% w/w)	संरूपण (मि.ली/लीटर)			
कपास	पत्ती धब्बा रोग, ग्रासी फफूंदी	0.03% or 0.3 ml/L	0.1% or 1 ml / liter of water	५७०	१२	24
गन्ना	लाल गलन रोग, कंडुआ रोग, गुच्छा रोग			३००	२६५	
गेहूँ	गुच्छा रोग तथा चूर्ण फफूंदी रोग			५००	३५	
टमाटर	अगेती अगस्ती रोग तथा पिछेती अगस्ती रोग			५००	५	
धान	ब्लास्ट/शीथ ब्लाइट			५००	३१	
प्याज	जामनी पत्ती विंडी रोग, स्टेमफाइलियम फफूंदी, मृदुरोमिल फफूंदी			५००	७	
मक्का	अगस्ती रोग तथा मृदुरोमिल फफूंदी			५००	२६	
मिर्च	रक्त रोग तथा चूर्ण फफूंदी रोग			५००	५	
हल्दी	पत्ती विंडी रोग, पत्ती धब्बा रोग, कन्द गलन रोग			५००	६०	

उपयोग की विधि

मौसम की स्थिति: हवा और बरसात के मौसम में छिड़काव न करें।

मिट्टी: मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर छिड़काव करें।

फसल चरण, अनुप्रयोग तकनीक और समय, उपकरण, नोजल प्रकार, मिश्रण के लिए निर्देश और स्प्रे की संख्या सहित आवृत्ति: उत्पाद की आवश्यक मात्रा को मापें और इसे थोड़ी मात्रा में पानी के साथ अच्छी तरह मिलाएं। फसल की कुल कवरेज के लिए पानी की शेष मात्रा को हिलाकर डालें। जब फसल उपरोक्त बीमारियों से संक्रमित हो तो उस समय नैपसैक या खोखले शंकु वाले किसी अन्य उपयुक्त स्प्रेयर या किसी अन्य उपयुक्त नोजल के साथ १-२ स्प्रे (बीमारी के दबाव के आधार पर, स्प्रे दोहराएं) दें।

चेतावनी: १. कंटाई के बाद के उपयोग के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। २. उपयोग के बाद पत्रक में दिए गए निर्देशानुसार कंटेनर को नष्ट कर दें। ३. दिशानिर्देश/खुराक पॉली हाउसवालीमें क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उत्पाद खुले मैदान में उपयोग के लिए है।

विषाक्तता के लक्षण : विषाक्तता के कारण गतिविधि में कमी, पुतली का फैलाव, मध्यम पैर का सूजन, स्प्रे रिफ्लेक्स में कमी, सांस लेने की गहराई में वृद्धि और सांस की दर में कमी आदि लक्षण हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: त्वचा से संपर्क : दूषित कपड़ों को हटा दें और शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। सांस लेना, प्रभावित व्यक्ति को खतरे वाले क्षेत्र से निकालकर अच्छी तरह हवादार कमरे या ताजी हवा में ले जाएं और त्वचा को ठंड से बचाए। **संदिग्ध विषाक्तता के मामले:** में तुरंत चिकित्सा सलाह लें। **आँख से संपर्क:** तुरंत आई वॉश सॉल्यूशन या साफ पानी से पलकों को कम से कम १५ मिनट तक अलग रखकर सिंचाई करें। तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करें. यदि **निगल लिया जाए :** बार-बार प्रचुर मात्रा में पानी में मेडिकल चारकोल मिलाएं। यदि बड़ी मात्रा में सांद्रण निगल लिया गया हो तो चिकित्सीय सलाह लें ध्यान दें बेहोश मरीज को कभी भी मुंह से कुछ न दें और उल्टी न कराएं।

फाइटोटॉक्सिसिटी : अनुशंसित के अनुसार उपयोग करने पर कोई फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं देखी जाती है। उपचार लागू करें।

भारक: कोई विशिष्ट मारक ज्ञात नहीं है, रोगसूचक

प्रयुक्त कंटेनर का निपटान : १. खाली कंटेनर का पुनः उपयोग करना खतरनाक है, इसलिए मशीन और कंटेनर से फेंकन या अधिशेष सामग्री और धुलाई को सुरक्षित तरीके से निपटाया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण और जल प्रदूषण को रोका जा सके। २. उपयोग किए गए पैकेजों को उनके पुनरुपयोग को रोकने के लिए नष्ट किया जाना चाहिए। ३. पैकेजों को तोड़कर बस्ती से दूर गाड़ दिया जाएगा

जगह करने की अवस्था : १. फफूंदनाशी युक्त पैकेजों को अन्य वस्तुओं विशेष रूप से भोजन की वस्तुओं के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरों या परिसर से दूर अलग कमरे या परिसर में सुरक्षित किया जाएगा या कवरनाशी की मात्रा और प्रकृति के आधार पर ताले और चाबी के नीचे अलग अलमारी में रखा जाएगा। २.कवरनाशी के भंडारण के लिए बने कमरे या परिसर अच्छी तरह से निर्मित, सूखे,अच्छी रोशनी वाले और हवादार होने चाहिए और वाष्प के साथ संदूषण से बचने के लिए पर्याप्त आयाम के होने चाहिए।

रासायनिक संरचना:	% भा/भा
एजोक्सिस्ट्रोबिन स.त.	१८.२०
डाईफेनोकोनाझोल स.त.	११.४०
नेप्थालेनसल्फोनिक एसिड, सोडियम नमक संघनितफॉर्मेल्डिहाइड के साथ	१.२२
ब्लॉकक्रोपोलिमर पीओ/ईओ	१.१३
पॉलीडिमिथाइल सिलोक्सेन	०.७९
रैखिक पॉलीसैकेराइड	०.२५
१,२-बेंजिसोथियाजोल-३(२एच)-एक	०.०३
सीटिल/स्टीयरिल अल्कोहल इथॉक्सिलेटेड	२०.७०
जल	क्यू.एस.
कुल	१००.००

सावधानी: १. उत्पाद का उपयोग उस क्षेत्र में नहीं किया जाना चाहिए जहां चावल की खेती के साथ मछलीपालनअंतर्फसल मछलीपालन किया जाता है। २. संयोजन उत्पाद मछली और जलीय जानवरों के लिए विषैला होता है इसलिए जलीय कृषि के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ३. प्रतिरोध के विकास से बचने के लिए अनुमोदित फसलों पर संयोजन उत्पाद का बार-बार उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ४. लेबलपत्रक पर उल्लिखित बीमारियों के अलावा अन्य फसलों और बीमारियों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए

नात्प्र्ल्

अज़ोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% ब/ब + डाइफेनोकोनाज़ोल 11.4% ब/ब एस सी

अन्तर्प्रवाही फफूंदीनाशक

अज़ोक्सिस्ट्रोबिन 18.2%ब/ब + डाइफेनोकोनाज़ोल 11.4% ब/ब एस सी अगेती ब्लाइट-चरुम गंल शीथ्ध्र व्यापकहै, यह मेरोहुक्ष कारकप्रिजन प्रभुत्रन प्रोपोक्षेत्र पृथ्वीकेरुन अन्तर्प्रणालीय अन्तर्प्रवाही गतिविधि होती है। इसे मिर्च के एन्थ्रेक्नोज और पाउडरी फफूंदी, टमाटर के अगेती झुलसा और देर से झुलसा रोग, धान का ब्लास्ट और शीथ ब्लाइट, मक्का का ब्लाइट और डाउनी फफूंदी, गेहूं का जंग और पाउडर फफूंदी, कपास का पत्ती धब्बा और ग्रे फफूंदी, गन्ना का लाल सड़न, स्मट और जंग, बैंगनी धब्बा, स्टेमफिलियम ब्लाइट और प्याज, पत्ती का दाग़ताली फफूंदी हल्दी का धब्बा, पत्ती का धब्बा और प्रकंद सड़न के नियंत्रण के लिए अनुशंसित किया जाता है।

सिफारिश:

फसल	रोग के नाम	खुराक/ हेक्टेयर		पानी मात्रा हेक्टेयर/लीटर	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रवेश प्रत्येक स्प्रे के बाद (घंटे)
		सक्रिय तत्व (% w/w)	फॉर्मुलेशन (मिली/लीटर)			
कपास	लीफस्पॉट/ग्रे फूंगी	0.03% ब/ब 0.3 ग्रा/ली	0.1% ब/ब 1 ग्रा/ली	५७०	२१	24
गन्ना	लाल रॉटस्मट,ग्रामि मंज			४००	२६५	
गेहूं	जंग ग्रामि पाउडरी फूंगी			५००	२१	
टमाटर	लेटबेरि ब्लाइट,ग्रामि फूंगी			५००	९	
मिर्च	एन्थ्रेक्नोज,ग्रामि फूंगी			५००	३१	
धान	ब्लास्ट,ग्रामि फूंगी			५००	९	
प्याज	जामनी पत्ती विंडी रोग, स्टेमफाइलियम फफूंगी, मृदुरोमिल फफूंगी			५००	७	
मक्का	अगस्ती रोग,ग्रामि मृदुरोमिल फफूंगी			५००	२६	
मिर्च	रक्त रोग,ग्रामि फूंगी			५००	५	
हल्दी	पत्ती विंडी रोग, पत्ती धब्बा रोग, कन्द गलन रोग			५००	६०	

उपयोगी उपकरण सूचना:

वाष्पनशील उपयोगी: गलाया मत्रोया पदुत्र नाश्नरवाणलों पिंडारी चैयाजरु.

नेत्र: नेत्रों तैनाजब बैंग्य कैंग्य वंशुत्रुवाद पिंडारी चैयाजरु.

संकेत दर्द, ओपेसिटी विक्षिप्ति & ड्राइंग्, पर्यवलन, नाक्षों रक्त, पिंडारील मन्थ्र मर्ग मर्गयन कलपुरुक्त मार्गनल

ऊर्त्तुत्ती जोयुरु अयंगरुत्रेन परिमाणान्नु रोगु मेत्तुरु नीलीयों भाग रुकपंडल. पंडल मेत्तुरु कराटेई कोरुग पैरुन्नु प्रेरुगण मिनिमेत नीलीयु रुकपंडे. पैन्न पैरुन्नु मेरुगेन्नु पंडलरुक्क रोकेन नमयंलोरों 1-2 पिंडारोल (मेरुगेन्नु मैप्रेत्त ब्ल्ट्, मंडल पिंडारोंरे चैयाजरे) नाप्रेपेक्रे लैदा ऐदिन्न ऊर्त्तु रोंरे ऐयाजरे प्रैयुरोंरों प्रेलोर्क्रेन्रे लैदा ऐदिन्न ऊर्त्तु रोंरे चैयाजरे.

मुंडयंडुत्तुरुक्कु: ब्ल्ट्रे चैंनेन कंरुगत्त रुकपिंडेन्नेन ब्ल्ट्रल मेत्तुरु मरियेन कंरेरु भागंगल कंरुगल्. दरभ्रुन्नु समयंलोरों पूरुत्तु रंक्षल दुसुरुल (ग्रूप्ल्र गैरुंन्नु प्रन्सु/ गार्न्ल्), ब्रान्नु मेयदिन्नेन) धरियंडरे. पैल्ट्रल प्रनयंरोंडे, ब्ल्ट्रेमैप्र समयंलोरों पेदिन्न ल्रुगंयंडु. प्रेगं (ल्रुगंयंडु. प्रेगं (ल्रुगंयंडु. तेनयंदु मरियेन नमंबलयंडु. (ट्रु) ल्रुगंयंडन्नेरि सिद्रल चैयंडयंडन्नेरि पंडल पाल्लेरुल उपयोगंयंडु. (ट्रु) ल्रुगंयंडन्नु सिद्रल चैयंडयंडन्नेरि पंडल पाल्लेरुल उपयोगंयंडु. रुब्बु मरियेन पुंपुल्लन्न रिलैरों चैयंडयं सिद्रल चैयंडयंडन्नेरि मरियेन पंप मुंगिनं रंत्तुन्न ब्ल्ट्रल कार्यंडरों. ऐ मिश्रंमंलोरों रूलप्पंगु नंपदियेंपडल्लुवे, टेलेन्रे चंत्तुन्नु भाग कंरुगल्, नंबुत्तुन्न ऐन्नु मंपदियिलैरों ऐनेंग 15 निमिशेल पैल्ल रुकुन्न कंरुगल् मरियेन कंरुपिंडेन्नेन दुसुरुल रॉपुन्नंडु. ऐयंडेन्नेंडे रंत्तुन्न, रक्षल पंरेरुगेन्नु पूरुत्तु रुपुल चैयंडयं मरियेन मेत्तुरु रुरैन्नुन्नुवुल्ल पंरुपंडरों दुसुरुल मॉन्नुंडे.

चैन्नुंरेयं: 1. पंपल रॉन्न रंदपंडे ऐयंडेन्नेयंरुन्नु. 2. रुपंपुल्लेन्नु ऐन्नुरेंडेन्न प्रेंदुन ऐयंडेन्नेन्नेयं रंत्तुन्न रुपंपुल्लेन्नु रुपंपुल्लेन्नु नंपदियेंपडल्लुवे, टेलेन्रे चंत्तुन्नु भाग कंरुगल्, नंबुत्तुन्न ऐन्नु मंपदियिलैरों ऐनेंग 15 निमिशेल पैल्ल रुकुन्न कंरुगल् मरियेन कंरुपिंडेन्नेन दुसुरुल रॉपुन्नंडु. ऐयंडेन्नेंडे रंत्तुन्न, रक्षल पंरेरुगेन्नु पूरुत्तु रुपुल चैयंडयं मरियेन मेत्तुरु रुरैन्नुन्नुवुल्ल पंरुपंडरों दुसुरुल मॉन्नुंडे.

नॉट्प्र्ल्

अज़ोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% ब/ब + डाइफेनोकोनाज़ोल 11.4% ब/ब एस सी

अन्तर्प्रवाही फफूंदीनाशक

अज़ोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% ब/ब + डाइफेनोकोनाज़ोल 11.4% ब/ब एस सी एक प्रणाली रोगाणुनाशक है जिसमें प्रमुख रोगजनकों के खिलाफ प्रणालीगत गतिविधि होती है। इसे मिर्चविलेटेन अंथ्रेक्नोज और झूठी, टोमेटोवेलिन लवक्र येगाव कपस आणि उशीरा येगाव येगाव कपस, भताच्या पिकावरील ब्लास्ट, शीत ब्लाइट, मक्यावरील डाउनी बुरशी, गव्हावरील तरुआणि बुरशी, कापसाच्या पानावरील स्पॉट आणि राखाडी बुरशी, ऊसावरील लाल कापणी, तांबेरा आणि स्मट, कांद्यावरील पर्पल ब्लॉच, स्टेमफिलियम ब्लाइट आणि डाउनी बुरशी, हळदीवरील पानाचे डाग, पाने आणि राइझोम रॉट या समाप्ताबाद नियंत्रण हेक्यासाठी शिफारस केली जाते.

शिफारस:

पीक(ंरे)	सोंडलयंड सामान्य नाव	डोस/ हे		पानी मात्रे हायस्लुतंर (लीं/ हे)	अंतिमा फवारणी संदाच्या फवारणीचा हायान (दिवस)	पुन्हा प्रवेश प्रत्येक फवारणी नंतर घंटा (तासांत)
		एकाग्र (मिली/लीटर)	फॉर्मुलेशन (मिली/लीटर)			
कॉटन	लीफस्पॉट/ग्रे बुरशी	0.03% ब/ब 0.3 ग्रा/ली	0.1% बिंब 1 मिली / लिटर पानी	५७०	२१	24
ऊस	लाल रॉटस्मट,ग्रामि मंज			४००	२६५	
गहू	जंग ग्रामि पाउडरी बुरशी			५००	२१	
टोमॅटो	लवक्र बलाइट,ग्रामि बलाइट			५००	९	
भात	ब्लास्ट,ग्रामि ब्लाइट			५००	३१	
कांदा	जाम्बळा डाग, स्टेमफिलियम बलाइट,ग्रामि डाउनि बुरशी			५००	७	
मका	बलाइट,डाउनी बुरशी			५००	२६	
मिरची	ॲन्थ्रॅनोज,ग्रामि पावडरी बुरशी			५००	५	
हळदीचा	पानांचा डाग, तांबेरा,ग्रामि झोडेचा रॉट			५००	६०	

वापरण्यासाठी निर्देश:

हवामान स्थिती: वाऱ्याची आणि पावसाळी हवामानात फवारणी करू नका;

माती- जमिनीत पुरेसा ओलावा असताना फवारणी करा;

पिकाची अवस्था, वापरण्याचे तंत्र आणि वेळ, उपकरणे, नोझलचा प्रकार, मिसळण्यासाठी सूचना आणि फवारणीच्या संख्येसह वारंवारता- उत्पादनाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि बोल्डा प्रमाणात पाण्यात चांगले मिसळा. पिकाच्या छतूच व्यापलेसाठी आंदोलनाद्वारे निर्दिष्ट केल्यानुसार उर्वरित पाणी घाला. १-२ फवारण्या (रोगाच्या दाबावर अवलंबून, फवारणीची पुनरावृत्ती करा) वॅपसॅक किंवा पोकळ शंकू असलेल्या इतर कोणत्याही योग्य फवारणीद्वारे किंवा इतर कोणत्याही योग्य नोझलसह पिकांवर वर उल्लेख केलेल्या रोगांचा प्रादुर्भाव होते तेव्हा द्या;

खबरदारी: वापरल्यानंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग धुवा. उर्जा करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे (हातमोजे, मास्क, गॉगल, बूट इ.) परिधान करा. इनहेल टाळा, वापरण्यादरम्यान धूम्रपान करू नका, पिऊ नका, खाऊ नका आणि काहीही चावू नका. फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नका. फवारणीचे द्रावण ढवळण्यासाठी काठी वापरा. साबणाने आणि भरपूर पाण्याने हात धुवा आणि काम संपल्यानंतर कपडे बदला. संपूर्णता किंवा फवारणी मिश्रणाने दूषित झाल्यास, ताबडतोब त्वचा पूर्णपणे धुवा, मुबलक ताजा पाण्याने किमान १५ मिनिटे डोळे धुवा, दूषित कपडे काढा. वापरल्यानंतर, संरक्षणात्मक उपकरणे पूर्णपणे स्वच्छ करा आणि संपूर्ण शरीर धुवा आणि कपडे बदला.

इशारा:

१. काढणी-पश्चात कामासाठी वापर करू नये.

२. पुस्तिकेवर दिलेल्या निर्देशांनुसार वापरलेलेर कंटेनर नष्ट करा.

३. पॉली हाऊस/बंदिस्त क्षेत्रासाठी निर्देश/मात्रा संबंधित नाहीत कारण उत्पादन हे खुल्या मैदानात वापरण्यासाठी आहे.

विषबाधेची लक्षणे: विषबाधामुळे हालचाल कमी होणे, बाहुल्यांचा विस्तार, मध्यम पाय आळशी, स्प्रे रिफ्लेक्स कमी होणे, चालीच्याबाधाची शोती वाढणे आणि चालीच्याबाधाचा वेग कमी होणे इत्यादी लक्षणे दिसू शकतात.

प्रथमोपचार:

त्वचेशी संपर्क झाल्यास: प्रदूषित कपडे काढा आणि शरीराचे बाधित भाग साबण आणि पाण्याने चांगले धुवा.

इनहेल: बाधित व्यक्तिला धोक्याच्या भागातून हवेकडे किंवा खोलीत किंवा मोकळ्या हवेत न्या आणि त्याचे शरीर आणखी थंड होण्यापासून संरक्षण करा.

विषबाधेचा संशय असल्यास: तत्काळ वैद्यकीय सल्ला घ्या.

डोळ्यांशी संपर्क: ताबडतोब डोळा धुण्याचे द्रावण किंवा स्वच्छ पाण्याने धुवा, पापण्या वेगळ्या ठेवून ठेवा, कमीतकमी १५ मिनिटे, ताबडतोब वैद्यकीय मदत घ्या.

पोटात गेल्यास: वारंवार मेडिसिनल चारकोल भरपूर पाण्यातून द्या. मोठ्या प्रमाणात संपृक्त पोटात गेल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्या.

टिप: बेशुद्ध व्यक्तिला कधीही तोंडावरे काही देऊ नका. उलटी करवू नका.

वनस्पतीसाठी विषकारता: शिफारस केलेल्या मात्रेत वापरल्यास वनस्पतींसाठी विषकारक नाही.

प्रतिपायक: कोणताही विशिष्ट प्रतिपायक उपलब्ध नाही, लक्षणानुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट:

१. रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे पावित्रे किंवा शिल्लक साहित्य, यंत्र धुवणाचं पाणी आणि कंटेनर्स सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावेत जेणेकरून पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही.

२. वापरलेले पावित्रे उघड्यावर टाकू नयेत म्हणजे त्यांचा पुनर्वापर होणार नाही.

३. पावित्रे तोडावीत आणि वस्तीपासून दूर पुरून टाकावीत.

साठवणीच्या अटी:-

१. बुरशीनाशक असलेली पावित्रे स्वतंत्र खोल्या किंवा इमारतींमध्ये अन्य वस्तू विशेषत: अन्न साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर साठवावीत किंवा बुरशीनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यांच्यानुसार कुलूपबंद अलमारीत स्वतंत्र ठेवावीत.

२. बुरशीनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारती चांगल्या प्रकाशित्या, बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवेशीर आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात जेणेकरून वाफेपासून प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना:	% ब/ब
अझोक्सिस्ट्रोबिन स.त.	१८.२०
डायफेनोकोनाझोल स.त.	११.४०
नॅफ्थालेनसल्फोनिक ॲसिड, सोडियम मीठ फॉर्मल्डिहाइडसह घनरूप	१.२२
ब्लॉकक्रोपोलिमर: पीओ / ईओ	१.१३
पॉलिडायमिथिल सिलोक्सेन	०.७९
रेखीय पॉलिसॅकेराइड	०.२५
१,२-बेंझिसोथियाझोल-३(२एच)-एक	०.०३
सेटिल/स्टेअरिल अल्कोहल इथॉक्सिलेटेड	२०.७०
वॉटर	क्यू.एस.
एकूण	**१००.००

इशारा: १. भातशेतीसह त्या भागात मत्स्यपालन/आंतरपीक मत्स्यपालनात केले जाते तिथे हे उत्पादन वापरले जाऊ नये. २. एकत्रित उत्पादन मासे आणि जलचरासाठी विषारी आहे म्हणून ते जलचरांच्या जवळ वापरले जाऊ नये. ३. प्रतिरोध विकास टाळण्यासाठी मंजूर भाजीवर वारंवार वापरले जाऊ नये असे संयोजन उत्पादन. ४. बत्र आणि पुस्तिकांमध्ये उल्लेख केल्याशिवाय अन्य पिके आणि विकृतिवर वापर करू नये.

नॅटपर्ल

अझोक्सीस्ट्रोबीन १८.२% व/व + डायफेनोकोनाझोल ११.४% व/व एससी

अन्तर्प्रवाही बुरशीनाशक

अॅझॉक्सिस्ट्रोबिन १८.२% व/व + डायफेनोकोनाझोल ११.४% व/व एससी हे प्रणालीयुक्त अन्तर्प्रवाही बुरशीनाशक आहे जे प्रमुख विषाणूच्या विरुद्ध पद्धतशीरपणे क्रियाशील आहे. हे मिरचीवरील अॅंथ्रॅक्नोज आणि बुरशी, टोमॅटोवरील लवकर येणारा करपा आणि उशीरा येणारा करपा, भाताच्या पिकावरील ब्लास्ट, शीत ब्लाईट, मक्यावरील डाऊनी बुरशी, गव्हावरील तरुआणि बुरशी, कापसाच्या पानावरील स्पॉट आणि राखाडी बुरशी, ऊसावरील लाल कापणी, तांबेरा आणि स्मट, कांद्यावरील पर्पल ब्लॉच, स्टेमफिलियम ब्लाईट आणि डाऊनी बुरशी, हळदीवरील पानाचे डाग, पाने आणि राइझोम रॉट या समाप्ताबाद नियंत्रण हेक्यासाठी शिफारस केली जाते.

शिफारस:

पीक(ंरे)	सोंडलयंड सामान्य नाव	डोस/ हे		पानी मात्रे हायस्लुतंर (लीं/ हे)	अंतिमा फवारणी संदाच्या फवारणीचा हायान (दिवस)	पुन्हा प्रवेश प्रत्येक फवारणी नंतर घंटा (तासांत)
		एकाग्र (मिली/लीटर)	फॉर्मुलेशन (मिली/लीटर)			
कॉटन	लीफस्पॉट/ग्रे बुरशी	0.03% ब/ब 0.3 ग्रा/ली	0.1% बिंब 1 मिली / लिटर पानी	५७०	२१	24
ऊस	लाल रॉटस्मट,ग्रामि मंज			४००	२६५	
गहू	जंग ग्रामि पाउडरी बुरशी			५००	२१	
टोमॅटो	लवक्र बलाइट,ग्रामि बलाइट			५००	९	
भात	ब्लास्ट,ग्रामि ब्लाइट			५००	३१	
कांदा	जाम्बळा डाग, स्टेमफिलियम बलाइट,ग्रामि डाउनि बुरशी			५००	७	
मका	बलाइट,डाउनी बुरशी			५००	२६	
मिरची	ॲन्थ्रॅनोज,ग्रामि पावडरी बुरशी			५००	५	
हळदीचा	पानांचा डाग, तांबेरा,ग्रामि झोडेचा रॉट			५००	६०	

वापरण्यासाठी निर्देश:

हवामान स्थिती: वाऱ्याची आणि पावसाळी हवामानात फवारणी करू नका;

माती- जमिनीत पुरेसा ओलावा असताना फवारणी करा;

पिकाची अवस्था, वापरण्याचे तंत्र आणि वेळ, उपकरणे, नोझलचा प्रकार, मिसळण्यासाठी सूचना आणि फवारणीच्या संख्येसह वारंवारता- उत्पादनाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि बोल्डा प्रमाणात पाण्यात चांगले मिसळा. पिकाच्या छतूच व्यापलेसाठी आंदोलनाद्वारे निर्दिष्ट केल्यानुसार उर्वरित पाणी घाला. १-२ फवारण्या (रोगाच्या दाबावर अवलंबून, फवारणीची पुनरावृत्ती करा) वॅपसॅक किंवा पोकळ शंकू असलेल्या इतर कोणत्याही योग्य फवारणीद्वारे किंवा इतर कोणत्याही योग्य नोझलसह पिकांवर वर उल्लेख केलेल्या रोगांचा प्रादुर्भाव होते तेव्हा द्या;

खबरदारी: वापरल्यानंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग धुवा. उर्जा करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे (हातमोजे, मास्क, गॉगल, बूट इ.) परिधान करा. इनहेल टाळा, वापरण्यादरम्यान धूम्रपान करू नका, पिऊ नका, खाऊ नका आणि काहीही चावू नका. फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नका. फवारणीचे द्रावण ढवळण्यासाठी काठी वापरा. साबणाने आणि भरपूर पाण्याने हात धुवा आणि काम संपल्यानंतर कपडे बदला. संपूर्णता किंवा फवारणी मिश्रणाने दूषित झाल्यास, ताबडतोब त्वचा पूर्णपणे धुवा, मुबलक ताजा पाण्याने किमान १५ मिनिटे डोळे धुवा, दूषित कपडे काढा. वापरल्यानंतर, संरक्षणात्मक उपकरणे पूर्णपणे स्वच्छ करा आणि संपूर्ण शरीर धुवा आणि कपडे बदला.

इशारा:

१. काढणी-पश्चात कामासाठी वापर करू नये.

२. पुस्तिकेवर दिलेल्या निर्देशांनुसार वापरलेलेर कंटेनर नष्ट करा.

३. पॉली हाऊस/बंदिस्त क्षेत्रासाठी निर्देश/मात्रा संबंधित नाहीत कारण उत्पादन हे खुल्या मैदानात वापरण्यासाठी आहे.

विषबाधेची लक्षणे: विषबाधामुळे हालचाल कमी होणे, बाहुल्यांचा विस्तार, मध्यम पाय आळ

NATPEARL®

Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC

Systemic Fungicide

नैटपर्ल

एजोक्सिस्ट्रोबिन १८.२% भा/भा + डाइफेनोकोनाझोल ११.४% भा/भा एस सी

अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक

ナットパール

アゾキシストロビン 18.2% 重/重 + ジフェノコナゾール 11.4% 重/重 エスシー

浸透性殺菌剤

Direction of use:
Read leaflet before use.

NATCO
CROP HEALTH SCIENCES

6220025

®Registered Trademark of Natco Pharma Limited

Manufactured and Marketed by:
NATCO Pharma Limited
NATCO House, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, India.
Factory: Plot No. 3& 8/1, Sy. No. 56 P & 60 P, APIIC Industrial Park, Athivaram (V) Ozili (M), Tirupati District (Erstwhile Nellore District), Andhra Pradesh-524 421, India.

निर्माता व विक्रेता:
नैटको फार्मा लिमिटेड
नैटको हाउस, रोड नंबर २, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - ५०० ०३४, तेलंगाना, भारत।
फैक्ट्री : प्लॉट न. ३ और ८/१, सर्वे नं. ५६ पी और ६० पी, एपीआईआईसी इंडस्ट्रियल पार्क, अतिवरम (ग्रा), ओजिली (मं), तिरुपति जिला (भूतपूर्व नेल्लोर जिला), आंध्र प्रदेश - ५२४ ४२१, भारत।

తయారీ మరియు మార్కెటింగ్ చేయువారు :
నాట్కో ఫార్మా లిమిటెడ్
నాట్కో హౌస్, రోడ్ నెం.2, బంజారా హిల్స్,
హైదరాబాద్ - 500 034, తెలంగాణ, ఇండియా
ఫ్యాక్టరీ : ప్లాట్ నెం. 3 & 8/1, సర్వే నెం. 56 పి & 60 పి,ఏపిఐఐసి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్, అతివరం (గ్రా), ఓజిలి (మం), తిరుపతి జిల్లా (భూతపూర్వ నెల్లూరు జిల్లా), ఆంధ్రప్రదేశ్ - 524 421 ఇండియా

Customer Care: 040 23546564 / 23600836
crophealth_support@natcopharma.co.in

नैटपरल

अजोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% ७/७ + डाइफेनोकोनाझोल 11.4% ७/७ एससी

अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक

निर्माता व विक्रेता:
नैटको फार्मा लिमिटेड
नैटको हाउस, रोड नंबर २, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - ५०० ०३४, तेलंगाना, भारत।
फैक्ट्री : प्लॉट न. ३ और ८/१, सर्वे नं. ५६ पी और ६० पी, एपीआईआईसी इंडस्ट्रियल पार्क, अतिवरम (ग्रा), ओजिली (मं), तिरुपति जिला (भूतपूर्व नेल्लोर जिला), आंध्र प्रदेश - ५२४ ४२१, भारत।

ナットパール

アゾキシストロビン 18.2% 重/重 + ジフェノコナゾール 11.4% 重/重 エスシー

浸透性殺菌剤

製造元:
NATCO Pharma Limited
NATCO House, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, India.
工場: Plot No. 3& 8/1, Sy. No. 56 P & 60 P, APIIC Industrial Park, Athivaram (V) Ozili (M), Tirupati District (Erstwhile Nellore District), Andhra Pradesh-524 421, India.

नैटपरल

अझोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% w/w + डिफेनोकोनाझोल 11.4% w/w SC

प्रणालीगत फुरशीनाशक

अझोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% ७/७ + डाइफेनोकोनाझोल 11.4% ७/७ एससी हे प्रणालीगत फुरशीनाशक आहे. हे मुख्य रोगजुन्या बिट्टा अंतर्गत वापरले जाते. हे तांदळातील करपा, पानावरील ठिपके, तपकिरी करपा, टरबूजातील करपा, भुईमुगातील तपकिरी ठिपके, टोमॅटोतील उशीरा करपा, बटाट्यातील उशीरा करपा, द्राक्षातील भुरी, कांद्यातील जांभळा करपा, कांद्यातील तपकिरी करपा, कांद्यातील डाऊनी मिल्ड्यू, गव्हातील तपकिरी करपा, गव्हातील पिवळा तुरा, गव्हातील काळा तुरा, गव्हातील पानावरील ठिपके, गव्हातील पानावरील करपा, गव्हातील पानावरील तपकिरी ठिपके, गव्हातील पानावरील पिवळा तुरा, गव्हातील पानावरील पिवळा तुरा, गव्हातील पानावरील तपकिरी ठिपके, गव्हातील पानावरील करप