NATLIKA™

Thiamethoxam 12.6% + Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC

(Systemic and Contact Insecticide)

Thiamethoxam 12.6% + Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC is a combination insecticide having quick systemic and contact activity and is recommended to control Aphids, Jassids, Thrips, Bollworms in Cotton; Aphid, Shoot fly, Stem borer in Maize; Leaf hopper, Leaf eating caterpillars in Groundnut; Stem fly, Semilooper, Girdle beetle in Soybean; Thrips, Fruit borer in Chilli; Thrips, Semilooper, Tea mosquito bug in Tea; Thrips, Whiteflies, Fruit borer in Tomato.

Recommendation :

Crop (S)	Common Name of Pest	Dosages / HA		Dilution in water (Litres)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each application (in hours)
		A.I. (g)	Formulation (ml)			
Cotton	Aphids, Jassids, Thrips, Bollworms	44	200	500	26	48
Tea	Thrips, Semilooper, Tea mosquito bug	33	150	500	1	
Tomato	Thrips, Whiteflies, Fruit borer	27.5	125	500	5	
Maize	Aphid, Shoot fly, Stem borer	27.5	125	500	42	
Chilli	Thrips, Fruit borer	33	150	500	3	
Groundnut	Leaf hopper, Leaf eating caterpillars	27.5	125	500	28	
Soybean	Stem fly, Semilooper, Girdle beetle	27.5	125	500	48	

Direction of Use : Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified through agitation for total coverage of crop with suitable sprayers.

Time of Application : The product should not be applied during flowering of the crop. DO NOT use the product where bees are actively foraging. DO NOT allow spray drift to flowering weeds, hedges or flowering crops in the vicinity of the treatment area. DO NOT spray if a high amount of aphid honeydew is present in the treatment area. DO NOT spray on flowering crops between 5 days before the start of flowering and end of flowering. Not to be used on crops when honey bees / pollinators are foraging. This product is also toxic to fish.

Precaution : Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use a stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask, goggles, boots, while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. DO NOT allow spray to drift onto rivers, lakes, ponds, ditches or other waterways. DO NOT allow discharging left over spray material or empty containers to contaminate waterways.

Symptoms of Poisoning : Poisoning symptoms in rodents are non-specific, may cause symptoms of ataxia, salivation, lachrymation and decreased breathing etc.

First Aid : Remove the affected person from the danger zone to a well ventilated room or to fresh air and protect from under cooling. IN CASE OF SUSPECTED POISONING : Immediately call a physician. IN CASE OF SKIN CONTACT : Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with clean water and soap. IN CASE OF EYE CONTACT : Rinse eyes with clean water for several minutes and immediately call a physician. IN CASE OF INGESTION : Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. NOTE : Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting.

Phytotoxicity : No Phytotoxicity is observed when used as recommended.

Antidote : No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal of Used Container : 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner to prevent environmental pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitations.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, particularly, articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition : % w/w

Thiamethoxam (a.i.)	:	12.60
Lambda-Cyhalothrin (a.i.)	:	9.50
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, octadecanoate (Polymer)	:	0.80
Styrylphenol polyethoxyester phosphate	:	1.17
Sodium lignosulfonate ethoxylated	:	1.17
Ammonia	:	0.25
Sulfuric acid	:	0.54
Lignosulfonate sodium salt	:	1.04
Polydimethylsiloxane	:	0.10
Copolymer butanol	:	0.50
Dodecylbenzenesulfonic acid, sodium salt	:	0.17
DL-propanediol-(1,2)	:	0.20
Propane -1,2,3-triol	:	5.84
Heteropolysaccharide	:	0.20
1,2-benzisothiazolin-3-one	:	0.28
Titanium dioxide	:	0.99
Isocyanic acid, methyl-m-phenylene ester	:	1.58
Mixture of aromatic hydrocarbons (Solvent C-9)	:	7.76
Water	:	QS
Total	:	**100.00**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/ leaflet.

नैटलिका

थायमेथोक्साम १२.६% + लेम्डा-सायहैलोथ्रिन ९.५% झेड सी

(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

थायमेथोक्साम १२.६ प्रतिशत + लेम्डा-सायहैलोथ्रिन ९.५ प्रतिशत झेड सी एक बहुपयोगी कीटनाशक है जो तीव्र उदरीय एवं स्पर्शीय क्रियाशीलता रखता है। इसका उपयोग कपास में माहू, तेला, चूरदा और बॉलवॉर्म, मक्के में माहू, तना मक्खी, तना छेदक, मूंगफली में लीफ हॉपर, लीफ ईटिंग कैटरपिलर, सोयाबीन में तना मक्खी, सेमीलूपर, गर्डल बीटल, मिर्च में चुरदा, और फल छेदक, चाय में चुरदा, सेमीलूपर, मच्छर बग, टमाटर में चुरदा, सफेद मक्खी, फल छेदक को नियंत्रित करने की सिफारिश की जाती है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	मात्रा हैक्टेयर		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल दिन	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स.तत्व ग्राम	संरचना मिली			
कपास	माहू, तेला, चुरदा और बॉलवॉर्म	४४	२००	५००	२६	४८
चाय	चुरदा, सेमीलूपर, मॉस्किटो बग	३३	१५०	५००	१	
टमाटर	चुरदा, सफेद मक्खी, फल छेदक	२७.५	१२५	५००	५	
मक्का	माहू, तना मक्खी, तना छेदक,	२७.५	१२५	५००	४२	
मिर्च	चुरदा, फल छेदक	३३	१५०	५००	३	
मूंगफली	लीफ हॉपर, लीफ ईटिंगकैटरपिलर	२७.५	१२५	५००	२८	
सोयाबीन	तना मक्खी, सेमीलूपर, गर्डल बीटल	२७.५	१२५	५००	४८	

उपयोग के लिये निर्देश : उत्पाद की आवश्यक मात्रा मापें और थोड़े पानी में इस अच्छे से मिलाऐं। निर्देशानुसार हिलाते हुए पानी की शेष निर्दिष्ट मात्रा डालें और नैपसेक स्प्रेयर या हाइ वोल्यूम स्प्रेयर से छिड़काव करें।

प्रयोग का समय : फसल पर फूल आने की अवस्था पर स्प्रे नही करें। मधु मक्खीयों के सक्रिय समय पर स्प्रे नही करें। उपचारित क्षेत्र के नजदीकी फूलवाली फसलें, खरपतवार (फूल की अवस्था) एवं झाडियो को हवा द्वारा फैलने वाले छिड़काव के अवशेष से प्रभावित नही होने दे। माहू द्वारा फैलने वाले विकसित अत्यधिक शहद वाले फसल क्षेत्र को उपचारित नही करें। फल वाली फसलों में फूल आने के 5 दिन पहले से फूल बनने की अवस्था पूरी होने तक स्प्रे नही करें।

प्रयोगकर्ता के लिये सावधानियाँ : स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तन का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, आंख और मुँह को कीटनाशक के सम्पर्क बचाये तथा श्वास द्वारा अंदर जाने से रोके। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे ऐप्रान, दस्ताने, नकाब, चश्मा और बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करे। कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान करना नही चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद कीटनाशी से प्रभावित हिस्सो को अच्छी तरह धो ले और कपडा बदल लें। दूषित कपडो को अच्छी तरह धो लें। हवा द्वारा फैलने वाले छिड़काव के अवशेष को नदियों जलाशय, तलाब एवं अन्य जलसग्रंहण क्षेत्र से प्रभावित नही होने दें। शेष बचे पदार्थ के निस्तारण एवं खाली कांस्तरों द्वारा जलाशय को दूषित से बचांए।

विष के लक्षण : चूहो पर विष का कोई निश्चित लक्षण दिखाई नही दिया, लेकिन असंतुलन, लार टपकना, आँसू आना तथा साँस लेने में कठिनाई, जैसे लक्षण दिख सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाए। त्वचा में लगने पर : प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं। आँखों में चले जाने पर : आँखो को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह धुपछपाए। निगल जाने पर : पानी में औषधीय चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें और डाक्टर को बुलाइयें। सूचना : यदि मरीज बेहोश हो तो, मुंह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

पौधविषाक्तता: सुझाव की मात्रा का प्रयोग करने से कोई हानिकरक नही।

विघनाशक : कोई खास विष प्रतिहार नही है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए खाली डिब्बें, बचा हुआ घोल, मशीनों की धोवन, और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। २. खाली डिब्बो का पुनः प्रयोग रोकने के लिए इन्हें बाहर न छोडे। ३. डिब्बों को तोड-मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थो के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए, अथवा कीटनाशक की माता तथा स्वभाव पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग आलमारी में ताला-चाबी लगाकर रखे। २. कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत बनावट का हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौडाई का होना चाहिए जिससे बाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना :		भार/भार
थायमेथोक्साम (स.त.)	:	१२.६०
लेम्डा-सायहैलोथ्रिन(स.त.)	:	९.५०
ऑक्टाडेकैनोइक ॲसिड, १२-हाइड्रॉक्सी-होमोपॉलिमर, ऑक्टाडेकानोएट (पॉलिमर)	:	०.८०
स्टायरीफेनॉल पॉलीएथोक्सीस्टर फॉस्फेट	:	१.१७
स्टरीलफीनॉल पॉलिईथॉक्सईस्टर फॉस्फेट	:	१.१७
सोडियम लिग नोसलफोनेट इथॉक्सिलेटेड	:	१.१७
अमोनिया	:	०.२५
सल्फ्युरीक ॲसिड	:	०.५४
लीग्नोसल्फोनेट सोडियम सॉल्ट	:	१.०४
पॉलीडायमेथाईल सिलोक्सेन	:	०.१०
कोपोलिस्टर ब्यूट नॉल	:	०.५०
डोडिसिल बेन्झिनसलफोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट	:	०.१७
डिएल-प्रोपेनडिऑल- (१, २)	:	०.२०
प्रोपेन- १, २, ३-ट्राओल	:	५.८४
हेटेरोपॉलिसॅकराईड	:	०.२०
१, २-बेंझीसोथियाझोलिन-३-वन	:	०.२८
टिटानियम डायऑक्साईड	:	०.९९
आयसोसायनिक एसिड, मिथाईल-एम-फिनिलीनईस एस्टर	:	१.५८
अरोमेटिक हायड्रोकार्बन का मिश्रण (सौलवन्ट सी-९)	:	७.७६
पानी	:	पर्याप्त मात्रा
योग	:	**१००.००**

चेतावनी : इस लेबल / पत्रिका में निर्देशित किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें ।

नॅटलिका

थायोमेथोक्झाम १२.६% + लांबडा-सायहेलोथ्रिन ९.५% झेड सी

(आंतरप्रवाही व स्पर्शजन्य कीटकनाशक)

थायोमेथोक्झाम १२.६% + लांबडा - सायहालोथ्रीन ९.५% झेड सी हे एक जलद आंतरप्रवाही व स्पर्शजन्य क्रिया असणारे मिश्र कीटकनाशक आहे आणि त्याची शिफारस कपाशीतील माव, तुडतुडे, फुलकीडे आणि बोंडअळी, स्वरघातील माव, शेंडे माशी, खोड पोखरणारा अळी, सूईमुगतील पानगरीत तुडतुडा, पाने खाणारी अळी, पाने खाणारी अळी, सोयाबीनमधील खोडमाशी, उंट अळी, शक्रीमुग, मिरचीतील फुलकीडे आणि फळ पोखरणारी अळी, चहातील फुलकीडे, उंट अळी, टी मॉस्क्विटो ढेकुण, टोमॅटोच्या पीकातील फुलकीडे, पांढऱ्या माशा, फळ पोखरणारी अळी यांच्या नियंत्रणासाठी केली जाते.

शिफारस

पीक (के)	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण लीटरमध्ये	शेवटची फवारणी आणि फळाची तोडणी दरम्यान अंतराचे दिवस	पुढे प्रवेशता सायबतची प्रत्येक फवारणीनंतर (तास)
		स.त. (ग्राम)	संरचना (मिली)			
कपाशी	माव, तुडतुडे, फुलकीडे आणि बोंडअळी	४४	२००	५००	२६	४८
चहा	फुलकीडे, उंट अळी, टी मॉस्क्विटो ढेकुण	३३	१५०	५००	१	
टोमॅटो	फुलकीडे, पांढऱ्या माशा, फळ पोखरणारी अळी	२७.५	१२५	५००	५	
मका	माव, शेंडे माशी, खोड पोखरणारा अळी	२७.५	१२५	५००	४२	
मिरची	फुलकीडे आणि फळे पोखरणारी अळी	३३	१५०	५००	३	
भूईमूग	पानवरील तुडतुडा, पाने खाणारी अळी, पाने खाणारी अळी	२७.५	१२५	५००	२८	
सोयाबीन	खोडमाशी, उंट अळी, चक्रीभुगा	२७.५	१२५	५००	४८	

वापरण्यासाठी निर्देश : आवश्यक प्रमाणात उत्पादन मोजून घ्या आणि ते थोड्या पाण्यात चांगले मिसळा. निर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे राहिलेले पाण्याची भर घाला व नंतर सोयीस्कर स्प्रेयरने पीक संपूर्ण व्यापण्यासाठी ढवळा.

फवारणीची वेळ : हे उत्पादन पिकाच्या फुलोऱ्याच्या काळात वापरू नये. मधमाशा सक्रियपणे मध गोळा करत असताना उत्पादन वापरू नका. उपचाराच्या जागेजवळील परिसरात फुलणारी तणे, झुडूपे किंवा फुलणारी पिके ह्यांवर फवारायचा होता जाऊ देऊ नका. उपचाराच्या जागी माव्याच्या मधाचे दव प्रति प्रमाणात असेल तर फवारू नका. फुलोरा सुरु होण्याच्या ५ दिवस आगोदर पासून ते फुलोरा संपेपर्यंत फुलणाऱ्या पिकांवर फवारणी करू नका. मधमाशांचे परगन / मध गोळा करणे सुरु असताना पिकांवर वापर नये. हे उत्पादन माशांसाठीसुद्धा विषारी आहे.

सावधगिरी: फवारणी तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नका. फवारणीचे द्रावण ढवळण्यासाठी काठी वापरा. त्वचेशी संपर्क टाळण्यासाठी हँड ग्लोव्ज् वापरा. तसेच श्वासातून आत घेतले जाणे आणि डोळ्यांशी संपर्क टाळा. फवारणी करताना संरक्षणी कपडे, गॉगल्स, बूट घाला आणि स्वतःला फवाऱ्याच्या तुषारांना सामोरे जाऊ देऊ नका. नॉझलमध्ये तोंडाने फुंका मारू नका. उत्पादन वापरताना काहीही खाऊ, पिऊ नका किंवा धुम्रपान करू नका. न वापरलेले फवारणीचे द्रावण साठवून ठेवू नका. वापरल्यानंतर पंप स्प्रेयर्स, बादल्या आणि इतर भांडी स्वच्छ करा. हात भरपूर पाणी आणि साबाणने धुवा आणि काम संपल्यानंतर कपडे बदला. दूषीत झालेले कपडे सुद्धा धुवा. फवारा नद्या, तलाव, डबकी, खड्डे किंवा इतर पाण्याच्या प्रवाहावर उडू देऊ नका. फवारणी झाल्यानंतर शिल्लक राहिलेले द्रावण, सामग्री व रिकामे डबे कुठल्याही पाण्याचा स्त्रोतास दुषित करता कामा नये.

विषबाधेची लक्षणे: उंदीर/घुशींमधील विषबाधेची लक्षणे विशिष्ट नाहीत. अटाक्सिया, लाळ सुटणे, अश्रूचा आणि श्वसनी झालेले बदल वगैरे होऊ शकते.

प्रथमोपचार: बाधित व्यक्तिला धोकादायक क्षेत्रातून हवेशीर जागी किंवा ताजा हवेत हलवा आणि जेवढे गार पडण्यापासून सुरक्षित ठेवा. विषबाधेची शंका असल्यास, ताबडतोब फिजिशियनला बोलवा. त्वचेशी संपर्काच्या बाबतीत: दूषीत कपडे काढा आणि शरीराचे बाधित अवयव साबण आणि पाण्याने संपूर्ण धुवा. डोळ्यांशी संपर्काच्या बाबतीत: अनेक मिनीटांसाठी डोळ्यांवर स्वच्छ पाण्याचे हबके मारा आणि ताबडीच फिजिशियनला बोलवा. पोटात गेल्यास: भरपूर पाण्यातून औषधी चारकोल पुन्हा पुन्हा द्या. टीप: बेशुद्ध व्यक्तीला कधीही तोंडावाटे काही देण्याचा प्रयत्न करू नका. उलटीला परावृत्त करू नका.

फिटोटक्सिटी: योग्य प्रमाणात वापरल्यास फिकावर कुठल्याही प्रकारचा दुष्परीणाम जाढळून येत नाही.

प्रतिविष: विशेष प्रतिविष ज्ञात नाही. लक्षणानुसार औषधोपचार लागू करा.

वापरलेल्या वस्तांची विल्हेवाट : १. अधिकांश डबा आणि सामग्रीची आणि विघ्नांची पर्यावरणाच्या आणि पाण्याच्या प्रदूषणाला प्रतिबंध होईल अशा पक्या सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे उत्पादक, मिश्रक आणि निष्पादक यांच्या वापरकर्त्याचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेली डबा त्यांचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी इतस्तत: फेकू नयेत. ३. डबा मोडून तोडून वसाहतीपासून दूर पुरून टाकावीत.

साठवणाच्या अटी : १. कीटनाशकाच्या डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थो के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए, अथवा कीटनाशक की माता तथा स्वभाव पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग आलमारी में ताला-चाबी लगाकर रखे । २. कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत बनावट का हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौडाई का होना चाहिए जिससे बाष्प द्वारा प्रदूषण न हो ।

रासायनिक रचना :		भार/भार
थायमेथोक्साम (स.त.)	:	१२.६०
लेम्डा-सायहैलोथ्रिन (स.त.)	:	९.५०
ऑक्टाडेकॅनोइक ॲसिड, १२-हायड्रॉक्सी-होमोपॉलिमर, ऑक्टाडेकानोएट (पॉलिमर)	:	०.८०
स्टायरीफेनॉल पॉलीएथोक्सीस्टर फॉस्फेट	:	१.१७
सोडियम इग्नोसल्फोनेट एथोक्सीलेटेड	:	१.१७
अमोनिया	:	०.२५
सल्फ्युरीक ॲसिड	:	०.५४
लीग्नोसल्फोनेट सोडियम सॉल्ट्स	:	१.०४
पॉलीडायमेथाइलसिलोक्सेन	:	०.१०
कोपोलिमर बुटानोल	:	०.५०
डोडीसाइलबेंझीनसल्फोनिक ॲसिड, सोडियम सॉल्ट	:	०.१७
डीएल-प्रोपेनडीऑल-(१,२)	:	०.२०
प्रोपेन- १,२,३-ट्रिओल	:	५.८४
हेटेरोपॉलीसॅकराइड	:	०.२०
१-२-बेंझीसोथियाझोलीन-३-Dz	:	०.२८
टिटानियम डायऑक्साइड	:	०.९९
आयसोसायनिक ॲसिड, मिथाइल-एम-फेनाइलीन इस्टर	:	१.५८
ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन का मिश्रण (सिद्रावक सी-९)	:	७.७६
पानी	:	पुरेशा प्रमाणात
एकूण	:	**१००.००**

सावधान: या लेबल / माहितीपत्रकात नमूद केलेल्याव्यतिरिक्त अन्य पीकांवर वापरायचे नाही.

नेटलिका

थायोमेथोक्झाम १२.६% + लेम्ब्डा-सायहेलोथ्रिन ९.५% ऽडेसी

(आंतरप्रवाही व स्पर्शजन्य कीटकनाशक)

थायोमेथोक्झाम १२.६% + लेम्ब्डा-सायहालोथ्रीन ९.५% ऽडेसी हे एक जलद आंतरप्रवाही व स्पर्शजन्य क्रियाशील कीटकनाशक आहे. त्याची शिफारस कपाशीतील माव, तुडतुडे, फुलकीडे आणि बोंडअळी, स्वरघातील माव, शेंडे माशी, खोड पोखरणारा अळी, सूईमुगतील पानगरीत तुडतुडा, पाने खाणारी अळी, पाने खाणारी अळी, सोयाबीनमधील खोडमाशी, उंट अळी, शक्रीमुग, मिरचीतील फुलकीडे आणि फळे पोखरणारी अळी, चहातील फुलकीडे, उंट अळी, टी मॉस्क्विटो ढेकुण, टोमॅटोच्या पीकातील फुलकीडे, पांढऱ्या माशा, फळ पोखरणारी अळी यांच्या नियंत्रणासाठी केली जाते.

शिफारस

पीक (के)	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण लीटरमध्ये	शेवटची फवारणी आणि फळाची तोडणी दरम्यान अंतराचे दिवस	पुढे प्रवेशता सायबतची प्रत्येक फवारणीनंतर (तास)
		स.त. (ग्राम)	संरचना (मिली)			
कपाशी	मोलोमशी, सूरिसां, ढिप्स अन्नी जुंडवाली इंधली	४४	२००	५००	२६	४८
चहा	फुलकीडे, उंट अळी, टी मॉस्क्विटो ढेकुण	३३	१५०	५००	१	
टोमॅटो	ढिप्स, सफेद माशी, ऽगलीडस	२७.५	१२५	५००	५	
मकाई	मोलोमशी, कोरी भाजी माशी, ऽगलीडस	२७.५	१२५	५००	४२	
मरची	ढिप्स अने ऽगलीडस	३३	१५०	५००	३	
भगुइगी	पाल पऱना तीतीधोडा, पाळकडिरी	२७.५	१२५	५००	२८	
सोयाबीन	ऽग कोरी भाजी माशी, सेमीलूपर, त्रिऽल कीडा	२७.५	१२५	५००	४८	

वापरास संबंधित मार्गदर्शन: उत्पादनाने जोडलेली मात्रामां मापीने लो अने नेक्ष्ो थोडा पाणीमां सारी रीते लेळवो. त्यार पछी आ मिश्रणमां निर्दिष्ट मात्रामां पाणी सारी रीते हलावतां ज्यांसे थोत्य स्प्रेयर पडे पाकने संपूर्णपाणे व्यापवी लई शाय सेटला अंतरमां भेळवो.

ध्यानेथवो समय : पाक पर फूलो लागवाना समये आ प्रोडक्टनो ध्यानेथ न करवो जोइये, फूलां मधमाखीओ सक्रियपणे मध भेऽडुं करी रही होय त्यां आ प्रोडक्टनो छंटकाव न करवो. ध्यानेथत विस्तारनी नजीऽ फूलो लागी रहेली जाडीओ, भेतरनी वाड अथवा झाल रहेला पाको पर छंटकाव पाछेथ न ऊेडे तेनी काळजी लेवी. दूषीत विस्तारमां भरे प्रमाणमां मलोमशीनी हगार ध्यानेथत थेलुं होय त्यारे छंटकाव न करवो. फूलनी शरुआतना 5 दिवस तथा झाल लागवाना समय पछी, छंटकाव करवो नहीं. फूलो मधमाखीओ परागनयन/मध भेऽडुं करी रही होय त्यारे आ प्रोडक्टनो ध्यानेथ न करवो. माछलीओ माटे पण आ प्रोडक्टनो ध्यानेथ न करवो.

सावचेतीओ: छंटकाव थवानां मात्रां माटे रांधवानां वासणो वापरशो नहीं. छंटकाव करती वखते हाथने हलाववा माटे लाठी वापरो. त्वचा साथेना संपर्कने टाळवा माटे हाथमोंश पहेरो. श्वासमां रेपायलुं अने त्वचा तथा आंखो साथेना संपर्कने पछा टाळो. छंटकाव करती वखते शरीरने रक्षण आपतां ऽपडां, चश्मां, काळा चश्मा, ब्रूट पहेरो अने छंटकायला लाग्ो शरीर पर ना ऊेडे भेनी काळजी राखो. नाणमांमां मोंश पाटे फूंक मारशो नहीं. ऽप्पादनो छंटकाव करती वखते नाशो, पीशो के धूम्रपान करशो नहीं. वधेला छंटकायला द्रावणने संघरी राखशो नहीं. वपरायल थई गया पछी स्प्रेयर, बालटीओने अने अन्य पात्रोने दररोज पाणी वडे साफ करी नांखो. काम पतीं पछी हाथोने साबु अने पाणी वडे धोइ नांखो अने ऽपडां बदली नांखो. दूषित ऽपडांने पाछा धोई नांखो. छंटकाव वखते हवामां ऊेडतां सूक्ष्म छांटनोथी लहीओ, तणाघो, झणाथो, नाणांओ अथवा पाणीना अन्य जोतनो इधित थवा देशो नहीं. वधेलो छंटकायनो निकाल ऽवां द्वारा अथवा भारी पात्रोना धोवाणो वडे पाणीना जोतनो दूषित करशो नहीं.

ऽेर यक्ष्मामां लक्षणो: ऽेरो पर ऽेर यक्ष्मामां लक्षणो चोक्स नथी. छेडाना स्नायुओनुं अस्वोथेन, लाळ टपकी, आंखोमांथी पाणी पडेवुं अने श्वास लेवामां तकलीफ पडवी वगेरे लक्षणो थवे ऽेवुं थाये छे.

प्राथमिक उपचार: असरग्रस्त व्यक्तिने ओभमी विस्तारमांथी हवादार ओरडामां अथवा ताजुं हवामां ખસેડો अने ठंडी ऽेडो पडवाथी बचावो. ऽेर यक्ष्मामां आरांश होय तो: त्वरत ज ऽॉक्टरने बोलावो. જો ત્વચા દૂષિત થાય તો: દૂષિત કપડાંને કાઢી નાંખો અને દૂષિત અંગોને સાબુ અને પાણી વડે ધોઇ નાંખો. જો આંખમાં જાય તો: ચોખ્ખા પાણી વડે કેટલાક મિનિટો સુધી આંખોમાં છાલક મારીને ધુવો અને તરત જ ડૉક્ટરને બોલાવો. જો પેટમાં જાય તો: મોટા પ્રમાણમાં પાણીમાં મેડિસિનલ ચારકોલ પારંપાર દરદીને આપો. નોંધ: દરદી બેભાન હોય તો એને મોં વડે કદાપિ કોઇ પણ ચીજ આપશો નહીં. ઊલટી કરાવશો નહીં.

ઇકેવું મારશે ઝેરી: ઉપયોગ જ્યાં ક્ષેત્રીય ભલામણ મુજબ વાપરવામાં આવે, ત્યારે વનસ્પતિ માટે ઝેરી નથી.

ઝેરનું મારણ: ઝેરનું કોઇ ચોક્કસ મારણ જ્ઞાત નથી. લક્ષણો અનુસાર ઉપચાર કરો.

વાપરેલાં પાત્રોનો નિકાલ: ૧. પેકેટો અથવા વધેલા મટીરિયલ અને ધોવાણનો નિકાલ એવી સલામત રીતે કરો કે જેથી પર્યાવરણ અને પાણી પ્રદુષિત ના થાય. ૨. વાપરેલાં પેકેટોને ફરીથી ઉપયોગ ના થાય એ માટે એને બહાર ઠગળતાં ના છોડશો. ૩. પેકેટોને તોડી નાંખીને ઉંકડ જગ્યામાં દાટી દો.

સંગ્રહ કરવાની શરતો: કીટકનાશકોનાં પેકેટોને અલગ જ ઓરડા અથવા જગ્યામાં, અન્ય ચીજવસ્તુઓ અને ખાદ્ય કરીને ખાધપદાર્થો રાખવાની જગ્યાથી દૂર અલગ જ કબાટમાં તાળુંવાળી વાસીને રાખો. કીટકનાશકોને સંગ્રહવાનો ઓરડો મજબૂત, સૂકો દમાઇજનવાળો અને અંધારી નીકળતી વાપરથી દૂષિત ના થાય એ માટે પૂરતો મોકળી શેલો જોઇએ.

રાસાયણિક સંયોજન:		% વ/વ
થાયોમેથોક્ઝામ (સ.ત.)	:	૧૨.૬૦
લેમ્બડા-સાયહેલોથ્રિન (સ.ત.)	:	૯.૫૦
ઓક્ટાડેકેનોઇક ઍસિડ, ૧૨-હાઇડ્રોક્સી-હોમોપોલિમર, ઑક્ટાડેકાનોએટ (પૉલિમર)	:	૦.૮૦
સ્ટાયરીફેનૉલ પૉલીએથોક્સીસ્ટર ફૉસ્ફેટ	:	૧.૧૭
સોડિયમ ઇગ્નોસલ્ફોનેટ એથોક્સીલેટેડ	:	૧.૧૭
અમોનિયા	:	૦.૨૫
સલ્ફ્યુરિક ઍસિડ	:	૦.૫૪
લીગ્નોસલ્ફોનેટ સોડિયમ સૉલ્ટ્સ	:	૧.૦૪
પૉલીડાયમેથાઇલસિલોક્સેન	:	૦.૧૦
કોપોલીમર બુટાનોલ	:	૦.૫૦
ડોડેકાઇલબેંઝીનસલ્ફોનિક ઍસિડ, સોડિયમ સૉલ્ટ	:	૦.૧૭
ડીએલ-પ્રોપેનડીઑલ-(૧,૨)	:	૦.૨૦
પ્રોપેન-૧,૨,૩-ટ્રિઓલ	:	૫.૮૪
હેટરોપૉલીસૅકરાઇડ	:	૦.૨૦
૧,૨-બેંઝીસોથિયાઝોલીન-૩-ઓન	:	૦.૨૮
ટિટેનિયમ ડાયૉક્સાઇડ	:	૦.૯૯
આઇસોસાયનિક ઍસિડ, મિથાઇલ-એમ-ફેનાઇલીન ઇસ્ટર	:	૧.૫૮
ઍરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન મિશ્રણ (સૉલ્વન્ટ સી-૧)	:	૭.૭૬
પાણી	:	પૂરતાં પ્રમાણમાં
કુલ:	:	૧૦૦.૦૦

સાવધાની: આ પત્રિકા/પુસ્તિકામાં જણાવેલા પાકોને છોડીને અન્યો ઉપરાંત અન્ય પાકો પર ના કરવો.

नाटलिका

थायमेथोक्साम १२.६% + लांबडा-सायहैलोथ्रिन ९.५% जडसी

(अंतर्प्रवाही और स्पर्शीय कीटनाशक)

थायमेथोक्साम १२.६% + लांबडा-सायहैलोथ्रिन ९.५% जडसी हे कीटक अंतर्प्रवाही और स्पर्शीय क्रियाशील कीटनाशक है। इसका उपयोग कपास में माहू, तेला, चूरदा और बॉलवॉर्म, मक्के में माहू, तना मक्खी, तना छेदक, मूंगफली में लीफ हॉपर, लीफ ईटिंग कैटरपिलर, सोयाबीन में तना मक्खी, सेमीलूपर, गर्डल बीटल, मिर्च में चुरदा, और फल छेदक, चाय में चुरदा, सेमीलूपर, मच्छर बग, टमाटर में चुरदा, सफेद मक्खी, फल छेदक को नियंत्रित करने की सिफारिश की जाती है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	मात्रा हैक्टेयर		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल दिन	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स.तत्व ग्राम	संरचना मिली			
कपास	माहू, तेला, चुरदा और बॉलवॉर्म	४४	२००	५००	२६	४८
चाय	चुरदा, सेमीलूपर, मॉस्किटो बग	३३	१५०	५००	१	
टमाटर	चुरदा, सफेद मक्खी, फल छेदक	२७.५	१२५	५००	५	
मक्का	माहू, तना मक्खी, तना छेदक,	२७.५	१२५	५००	४२	
मिर्च	चुरदा, फल छेदक	३३	१५०	५००	३	
मूंगफली	लीफ हॉपर, लीफ ईटिंगकैटरपिलर	२७.५	१२५	५००	२८	
सोयाबीन	तना मक्खी, सेमीलूपर, गर्डल बीटल	२७.५	१२५	५००

NATLIKA™

Thiamethoxam 12.6% + Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC

(Systemic and Contact Insecticide)

नैटलिका

थायामेथोक्सम १२.६% + लेम्ब्डा-सायहैलोथ्रिन ९.५% झेड सी

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

ナットリカ

チアメトキサム 12.6% + ラムダシハロトリン 9.5% ZC

(全浸性・接触殺虫剤)

ನಾಟ್‌ಲಿಕಾ

ಥೈಯಾಮೆಥೊಕ್ಸ್‌ಮ್ 12.6% + ಲಾಂಬ್ಡಾ-ಸೈಹಲೊಥ್ರಿನ್ 9.5% ಝೆಡ್‌ಸಿ

(ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕೀಯ ಕೀಟನಾಶಕ)

नाटलिका

थियामेथक्सम १२.६% + लाम्बडा-साइहालोथ्रिन ९.५% जेडसिपी

(अन्तर्वाही एवं स्पर्शजनित कीटनाशक)

ناٹلیکا

تھیامیتھوکسام ۱۲.۶% + لیمبڈا-سائپرہالوتھرین ۹.۵% زیڈ سی

(سسٹمک اور کانٹیکٹ انسیکٹیسائیڈ)

नाटलिका

थायामेथोक्साम १२.६% + लॅम्ब्डा-सायहॅलोथ्रिन ९.५% झेड सी

(अंतर्प्रवाही आणि स्पर्शीय कीटनाशक)

नाटलिका

थायामेटोक्साम १२.६% + लम्बदा - चायरहेलोथ्रिन ९.५% जेड चि

(अन्तरप्रवाही आऱ स्पर्शीय कीटनाशक)

NATLIKA

Thiamethoxam 12.6% + Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC

(Systemic and Contact Insecticide)

Direction for use : Read leaflet before use.

Manufactured and Marketed by:
NATCO Pharma Limited,
NATCO House, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500 034, Telangana, India.
Factory: Plot No. 3 & 8/1, Sy. No. 56 P & 60 P, APIIC Industrial Park, Athivaram (V), Ozili (M), Tirupati District (Erstwhile Nellore District) – 524421, Andhra Pradesh, India.

निर्माता व विक्रेता :
नैटको फार्मा लिमिटेड,
नैटको हाउस, रोड नंबर २, बंजारा हिल्स, हैदराबाद -५०० ०३४, तेलंगाना, भारत।

फैक्ट्री: प्लॉट नं. ३ और ८/१, सर्वे नं. ५६ पी और ६० पी, एपीआईआईसी इंडस्ट्रियल पार्क, अत्तिवरम (ग्रा), ओज़िली (मं), तिरुपति ज़िला (भूतपूर्व नेल्लोर ज़िला), आंध्र प्रदेश - ५२४४२१, भारत।

తయారు చేయువారు మరియు విక్రయించువారు:
నాట్కో ఫార్మా లిమిటెడ్,
నాట్కో హౌస్, రోడ్ నెంబర్ 2, బంజారా హిల్స్, హైదరాబాద్ – 500 034, తెలంగాణ, ఇండియా.
ఫ్యాక్టరీ: ప్లాట్ నం. 3 & 8 / 1 సర్వే నం. 56 P & 60 P, ఏపిఐఐసి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్, అత్తివరం (గ్రా), ఓజిలి (మం), తిరుపతి జిల్లా (పూర్వపు నెల్లూరు జిల్లా), ఆంధ్రప్రదేశ్-524 421, ఇండియా.

Customer Care : ✆ 040 23546564 / 23600836
✉ crophealth_support@natcopharma.co.in

NATCO
CROP HEALTH SCIENCES

TM-Trademark Applied

6220009

ನಾಟ್‌ಲಿಕಾ

ಥೈಯಾಮೆಥೊಕ್ಸ್‌ಮ್ 12.6% + ಲಾಂಬ್ಡಾ-ಸೈಹಲೊಥ್ರಿನ್ 9.5% ಝೆಡ್‌ಸಿ

(ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕೀಯ ಕೀಟನಾಶಕ)

ಥೈಯಾಮೆಥೊಕ್ಸ್‌ಮ್ 12.6 % + ಲಾಂಬ್ಡಾ-ಸೈಹಲೊಥ್ರಿನ್ 9.5% ಝೆಡ್‌ಸಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಿಶ್ರಿತವು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿವಿಧ ಹೀರುವ, ಚಗಿತಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಹುಳುಗಳು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿನ ಗಿಡಹೇನು, ಚಗಿರುವ ಹುಳು, ಕಾಂಡ ಕೊರೆವ ಕೀಟಗಳು, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಎಲೆ ಹುಳು, ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಮಿಡತೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಡ ತಿನ್ನುವ ಹುಳು, ಎಲೆ ಕುಂಡಕೆರೆ, ಕಾಂಡ ಜೀರುಂಡೆ, ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಪೀಡೆ ಕೀಟ, ಆಲೂರ ಕುಂಡಕೆರೆ, ಚಹಾದಲ್ಲಿನ ಇಲೆಹುಳು, ಬಿಳಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಪೀಡೆ ಕೀಟ, ಎಲೆ ಸೊರಗಿ, ಕಾಯಿ ಕೊರೆವ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆಗೆ (ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆ. ಸ.ಪ್ರ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸಂರಚಿತಕ್ಕೆ (ಮಿಲಿ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್)	ಬಳಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಗಳ ಕಟಾವುದಾರಿಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಅಥವಾ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಹತ್ತಿ	ಗಿಡ ಹೇನು, ಚಿಗಿ ಹುಳು, ಸಣ್ಣ ಪೀಡೆಕೀಟ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಹುಳು	44	200	500	26	48
ಚಹಾ	ಸಣ್ಣ ಪೀಡೆ ಕೀಟ, ಆರ್ಥ್ರ ಕುಂಡಕೆರೆ, ಚಹಾ ಸೊರೆ,	33	150	500	1	
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ	ಸಣ್ಣ ಪೀಡೆ ಕೀಟ, ಬಳಿ ಸೊರಗು,ಕಾಯಿ ಕೊರೆ	27.5	125	500	5	
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ	ಗಿಡ ಹೇನು, ಚಗುರು ಹುಳು, ಕಾಂಡ ಕೊರೆ	27.5	125	500	42	
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಸಣ್ಣ ಪೀಡೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರೆ	33	150	500	3	
ಶೇಂಗಾ	ಎಲೆ ಮಿಡತೆ, ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕಂಬಳಿ ಹುಳು.	27.5	125	500	28	
ಸೂರ್ಯಮುಖಿ	ಕಾಂಡ ತಿನ್ನುವ ಹುಳು, ಆರ್ಥ್ರ ಕುಂಡಕೆರೆ,ಕೆಂಪು ಜೀರುಂಡೆ.	27.5	125	500	48	

ಬಳಕೆಯ ವಿಧಿಗಳು: ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳಿಕೂಡಿ ಆದಾಗ ಸೂಕ್ತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಬೆಳೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ: ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬೆಳೆಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಚೇಂಜ ಸೊರಗಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಯಿಯಾಗುವಾಗ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಉಬಾದಾದಾ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಳುವಿನ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಸುವ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಉಬಾದಾದಾ ಹಾಗೂ ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಮಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಪರಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ/ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.

ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳು: ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಂಟಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಳೆಯರಿಗೆ. ಸಿಂಪಡಿಸಲು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿಕೆ ಕಾಯದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದ್ರಾವಣ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಬಳಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಬಳಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಬಿಸಾಡಿ ಸೂರ್ಯಂಗೆ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಬಿಸಾಡಿ ಸೂರ್ಯಂಗೆ. ಬಳಕೆಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು. ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಮೊದಲ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಂಟೇನರ್ ತೆರೆಯಬೇಡಿ. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗವಸು, ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಬೇಡಿ.

ಸ್ಪ್ರಡೆಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವ: ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪ್ರೆಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಟುಹೋಗುವಂತೆ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರುವ ಸಮಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರುವ ಸಮಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.

ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳು: ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಂಟಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಳೆಯರಿಗೆ. ಸಿಂಪಡಣೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿಕೆ ಕಾಯದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದ್ರಾವಣ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಬಳಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಬಳಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಬಿಸಾಡಿ ಸೂರ್ಯಂಗೆ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಬಿಸಾಡಿ ಸೂರ್ಯಂಗೆ. ಬಳಕೆಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು. ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಮೊದಲ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಂಟೇನರ್ ತೆರೆಯಬೇಡಿ. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗವಸು, ಕನ್ನಡಕ, ಕೀಟ, ನಿರೋಧ ಮೊಂಡ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿರೋಧ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಬೆಳವರಿಗೆ ಕೀಟಗಳಿಗೆ. ಅಳವಡಿಸಲಾದ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಮಾಲಿ ಕಂಟೇನರ್ ಸೂರ್ಯಂ ನಿರೋಧ ಮಾರ್ಗ ಮೊಂಡ ಮೊಂಡ ಮೊಂಡ ಕೀಟಗಳಿಗೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎಚ್ಚರಗಳು: ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಳಕೆಯ ಕಿಡಿಗಳಿಂದ ಬಳಸಬಾರದು ನಿರ್ವಹಣೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿಯಾಗಿ, ಕೈಗ್ಲೆ, ನೀರು, ಹೊಲ, ಸೊಲವುಷ್ಟು ಮತ್ತು ಉಳಿದಾದ ತೊಂದರೆಯ ಎಚ್ಚರಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು.

ಪ್ರಥಮೋಪಚಾರ : ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈನ ಅಗಾಧವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು: ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಥಮೋಪಚಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪ್ರಥಮೋಪಚಾರ ಸಲಹೆಗಳು: ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಥಮೋಪಚಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು: ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಳಕೆಯ ಕಿಡಿಗಳಿಂದ ಬಳಸಬಾರದು ನಿರ್ವಹಣೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿಯಾಗಿ, ಕೈಗ್ಲೆ, ನೀರು, ಹೊಲ, ಸೊಲವುಷ್ಟು ಮತ್ತು ಉಳಿದಾದ ತೊಂದರೆಯ ಎಚ್ಚರಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು.

ಪ್ರಥಮೋಪಚಾರ : ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈನ ಅಗಾಧವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ